Omex **NK60**

FONCTION

Le Potassium est un macro-éléments fertilisant nécessaire en de grandes quantités pour une croissance normale et un développement normal de la plante. Il est intégralement impliqué dans le métabolisme et les relations avec l'eau de la plante. Un rôle important du K est le contrôle des mouvements stomatiques. Le Potassium joue également un rôle important dans la photosynthèse et est impliqué dans le transport des sucres à partir de la feuille.

Les carences visuelles de Potassium se traduisent par une légère marbrure des feuilles au niveau des marges et entre les veines. En ce qui concerne le coton, la marge et l'extrémité de la feuille vont s'enrouler vers le bas et la feuille va finir par prendre une couleur rouille, devenir cassante et tomber prématurément et arrêter ainsi le développement des capsules.

DESCRIPTION

Omex NK60 est une émulsion très concentrée, soluble dans l'eau, qui contient du Potassium et de l'azote.

Analyse

		Wt/Wt*	Wt/Vol
Azote	N	**7.60%**	11.10%
Potassium	K_2O	**26.70%**	39.00%
Chlorure	less than 1.00%		

pH (solution à 10%)	6.25-7.25
Gravité spécifique	1.44-1.48 @ 18°C

* Pour les enregistrements de produits des concentrations poids/poids sont recommandés.

CONSEIL D'UTILISATION

Remplir la cuve à moitié le la quantité requise. Mesurer la quantité nécessaire de OMEX NK60 et l 'ajouter dans la cuve tout en maintenant une agitation continue. Compléter le reste de la cuve avec de l 'eau. Vaporiser.

OMEX AGRIFLUIDS

www.omex.com

DILUTION: La quantité d 'eau recommandée est de 500 à 1500 L par hectare.

Toujours bien agiter avant emploi

Recommandation d'utilisation:

CULTURA	QUANTITÉ l/ha	QUANTITÉ ml/100l	DÉTAILS DE LA DEMANDE
Avocats	2.5	500	Applications multiples nécessaires jusqu'à 30 jours avant la récole.
Pommes	2.0	400	2-3 applications à partir de la chute des pétales jusqu'à la phase de l'apparition du petit fruit.
Vignes	2.0	400	2-3 applications à partir de la floraison jusqu'à la maturation.
Fleurs	2.0	400	3-4 applications pendant la phase de croissance principale.
Olives	2.0	400	3-4 applications pendant le développement du fruit.
Agrumes	2.0	400	1 – 3 applications.
Coton	2.5	500	2 applications au début et à la fin du mûrissement des capsules appliquer avec du bore à 2 l/ha.
Pommes de terre	2.0	400	2-3 applications à partir de la floraison jusqu'à la tubérisation.
Maïs	2.0	400	1-2 applications pendant la période de croissance
Poivrons/tomates	2.5	500	2-3 applications à partir de la nouaison.

COMPATIBILITÉ DES MÉLANGES EN CUVE

Omex NK60 est compatible avec la majorité - mais pas tous - des pesticides, régulateurs de croissance et micro nutriments en regard des effets biologiques et des mélanges physiques en cuve sur les cultures. Cependant OMEX ne peut accepter toute responsabilité pour perte ou dommage en raison du fait que tous les pesticides n'ont as été testés mais aussi par ce que l'efficacité de tout mélange dépend d'autres facteurs dont parmi eux les pesticides, les conditions de culture, les stades de croissances, les conditions climatiques et les volumes d'eau utilisés.

PRÉCAUTION

Stocker OMEX NK60 hors gel dans un lieu de stockage en conditions de 5-40°C. OMEX NK60 est un engrais non dangereux et non inflammable. Utilisez des gants et un masque lors de la manipulation de concentré. Au bout d 'une longue période de stockage il peut y avoir un léger dépôt de particules nutritives. Ceci se solutionne en agitant fortement.

CONDITIONNEMENT: Omex NK60 est disponible en bidons HDPE (haute Gravité spécifique poly éthyléne) de 1L, 3L, 5L, 10L. Les bidons répondent aux exigences de sécurité. Disponsible aussi en cuve de 200 et 1000L.

OMEX AGRIFLUIDS

Omex Agrifluids Limited
Saddlebow Road • King's Lynn • Norfolk PE34 3JA • UK
t: +44 (0)1553 817 500 • f: +44 (0)1553 817 501
e: agrifluids@omex.com • ***www.omex.com***