

Omex Foliar Boron

ФУНКЦИЯ

Борът участва активно при преноса на захари през клетъчните стени и синтеза градивните елементи на стените. Поради факта, че влияе на развитието на клетката, недостатъчното количество бор ще забави растежа и развитието.

Недостиг на бор може да се появи при всички земеделски култури. Основните фактори влияещи върху усвояемостта на бор са почвената реакция (pH) и нейната влажност. При отглеждане на култури при засушливи условия и на почви с pH под 6,5 има реална опасност от боров дефицит.

Липсата на бор причинява чупливи листа при сорго, зелеви култури и захарно цвекло.

Образуването на полен се влияе изключително много от наличието на бор. Изисква се достатъчно количество бор за поленообразуването и жизнеспособността на полена.

ОПИСАНИЕ

Напълно водоразтворим тор съдържащ азот и бор.



Съдържание

		Wt/Wt*	Wt/Vol
Общ Азот	N	4.80%	6.50%
Бор	B	11.00%	15.00%
pH(10% разтвор)		8.0-9.0	
Специфична плътност		1.35-1.39 @ 18°C	

*За целите на регистрацията се препоръчват концентрации Wt / Wt

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА

Напълнете пръскачката с половината от необходимото количество вода. Прибавете определеното количество от Foliar Boron в пръскачката при постоянно бъркане. Допълнете пръскачката.



РАЗРЕЖДАНЕ : Препоръчителното количество вода – 50-150 л/дка

Преди употреба разклатете добре опаковката.



Препоръчителни дози:

КУЛТУРА	ДОЗА л/дка	ДОЗА мл/100 л вода при капково напояване	БРОЙ ПРЪСКАНИЯ И ВРЕМЕ НА ПРИЛОЖЕНИЕ
Рапица	0.25		след розетка – 5-6 лист и преди нарастване на страничните разклонения
Слънчоглед	0.25		5 – 8-ми лист
Зеленчуци	0.2-0.3	400	след разсаждане ,2ро- приложение преди стопанска зрялост
Овощни	0.2	200	3-кратно през вегетацията, I-во – след опадване на венчелистчетата, а последва- щите – през 2-3 седмици

СЪВМЕСТИМОСТ С ДРУГИ ПРЕПАРАТИ

Foliar Boron е съвместим с повечето, но не с всички пестициди, растежни регулатори и микроелементи по отношение на самото му смесване с тях в пръскачката и биологичните ефекти върху реколтата. OMEX не може да поеме никаква отговорност за каквато и да е загуба или щета, тъй като не всички пестициди са тествани и защото ефективността на която и да е смес ще зависи от, освен други фактори, и от самия пестицид, състоянието и фазата на растенията, метеорологичните условия и количеството използван разтвор. Не смесвайте със сулфати и фосфати.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

Foliar Boron трябва да се съхранява в условия, които не позволяват замръзване на продукта. Оптимална температура на съхранение 5-40°C. Foliar Boron е безопасен и незапалим листен тор. Трябва да се носят предпазни ръкавици и маска, когато се работи с концентрата. При продължително съхранение може да се получи леко утаяване, което е обратимо чрез леко разклащане на опаковката.

ОПАКОВКА: В HDPE ТУБИ ОТ 0,25L, 0,5L, 1L, 5L, 10L, 20L 200L, 1000L С НАДЕЖДНО ЗАТВОРЕНИ КАПАЧКИ.

OMEX
AGRIFLUIDS

Omex Agrifluids Limited
Saddlebow Road • King's Lynn • Norfolk PE34 3JA • UK
t: +44 (0)1553 817 500 • f: +44 (0)1553 817 501
e: agrifluids@omex.com • www.omex.com