

Omex Folicao

FUNCIÓN

Omex Folicao es un fertilizante foliar líquido de alta concentración, diseñado para aplicarse a las partes foliares del árbol de cacao y muchos otros cultivos.

Las aplicaciones regulares de Omex Folicao mejorarán la calidad y el rendimiento del cacao y otros cultivos.

Omex Folicao tiene un impacto muy positivo en el rendimiento del cacao, con vainas más abundantes y más grandes y granos de cacao de mejor calidad.

DESCRIPCIÓN

Un fertilizante en suspensión completamente soluble en agua que contiene NPK, Magnesio y oligoelementos quelados.



Análisis

			P/P*	P/V
Nitrogeno		N	8.70%	13.50%
Nitrate			6.60%	10.30%
Ammonium			2.10%	3.20%
Fosfato		P ₂ O ₅	17.20%	27.00%
Potasio		K ₂ O	17.20%	27.00%
Magnesio		MgO	1.00%	1.60%
Hierro	(EDTA)	Fe	0.106%	0.166%
Zinc	(EDTA)	Zn	0.053%	0.083%
Cobre	(EDTA)	Cu	0.053%	0.083%
Manganeso	(EDTA)	Mn	0.053%	0.083%
Boro		B	0.022%	0.034%
Cobalto	(EDTA)	Co	0.0008%	0.0012%
Molybdeno		Mo	0.0008%	0.0012%

pH (10% Solucion)

4.0-5.0

Densidad

1.54-1.58 @ 18°C

* para el proceso de registro de productos se aconseja emplear las concentraciones peso/peso

INSTRUCCIONES DE USO

Debe llenarse el tanque con la mitad del agua indicada. Agitar vigorosamente el contenedor, medir la cantidad necesaria de Omex Folicao y añadirla al tanque mientras hay una agitación constante. Añadir el resto del agua hasta conseguir la dilución correcta. Aplicar.

OMEX
AGRIFLUIDS



www.omex.com

DILUCIÓN: El volumen de agua recomendado es de 500-1500 litros por hectárea

Antes de abrir agitar siempre el contenedor



Recomendaciones de uso:

CULTIVO	DOSIS l/ha	DOSIS ml/100l	DETALLES DE LA APLICACIÓN
Cacao	2.0-4.0	200-400 (30-60ml/15l)	Aplicar durante los períodos de crecimiento activo, si la deficiencia es severa repetir las aplicaciones a los 10-14 días
Frijoles	2.0-4.0	200-400	Aplicar durante los períodos de crecimiento activo, si la deficiencia es severa repetir las aplicaciones a los 10-14 días
Brassicas	2.0-4.0	200-400	Aplicar durante los períodos de crecimiento activo, si la deficiencia es severa repetir las aplicaciones a los 10-14 días
Maíz, Arroz, Sorgo	2.0-4.0	200-400	Aplicar durante los períodos de crecimiento activo, si la deficiencia es severa repetir las aplicaciones a los 10-14 días
Patatas	2.0-4.0	200-400	Aplicar durante los períodos de crecimiento activo, si la deficiencia es severa repetir las aplicaciones a los 10-14 días
Guisantes	2.0-4.0	200-400	Aplicar durante los períodos de crecimiento activo, si la deficiencia es severa repetir las aplicaciones a los 10-14 días
Los tomates	2.0-4.0	200-400	Aplicar durante los períodos de crecimiento activo, si la deficiencia es severa repetir las aplicaciones a los 10-14 días
Yuca	2.0-4.0	200-400	Aplicar durante los períodos de crecimiento activo, si la deficiencia es severa repetir las aplicaciones a los 10-14 días

COMPATIBILIDAD

Omex Folicao es compatible con la mayoría, pero no todos los pesticidas, reguladores del crecimiento y micro nutrientes en cuanto a propiedades físico químicas de mezcla y a efectos biológicos en el cultivo. Sin embargo Omex no acepta ningún tipo de responsabilidad por los daños o pérdidas que puedan derivarse ya que no todos los pesticidas han sido testados y porque la eficacia de cada mezcla dependerá entre otros factores, del pesticida utilizado, de las condiciones del cultivo, del estado de crecimiento, del tiempo y de los volúmenes de agua utilizados.

PRECAUCIONES

Omex Folicao debe protegerse de temperaturas extremas. Mantenerlo en un intervalo de temperaturas óptimas de 5-40°C. Omex Folicao es un producto foliar no tóxico y no inflamable. Se recomienda el uso de protección adecuada durante su aplicación.

ENVASADO - Folicao se encuentra disponible en contenedores de HPPE de 1l, 3l, 5l y 10l de capacidad. Los contenedores vienen equipados con cierres TE. También se disponen de contenedores de 200l y 1000l.